

Informe sobre el relevamiento ornitológico en el Área Silvestre Protegida “El Pantanoso”

Entre los días 13 y 17 de julio se realizó el relevamiento ornitológico dentro de la propiedad y sus alrededores.

Área de estudio

Se encuentra en el centro este de la provincia de Jujuy y limita al norte con la provincia de Salta, justo en su límite interprovincial. El área está ubicada a unos 16 kilómetros del pueblo de Bananal.

El área se encuentra en la eco-región de las Yungas y cuenta con una extensión de 4.400,5 ha. Sin embargo, debido a que el gradiente altitudinal de la misma no es pronunciado, hay un único ambiente representado: Selva Pedemontana la cual se caracteriza por ser caliente y húmeda, con precipitaciones focalizadas en los meses de primavera y verano en el orden de los 900-1000 mm. Sus especies arbóreas representativas son la tipa blanca (*Tipuana sp.*), los cebiles (*Anadenanthera sp.*), lapachos (*Tabebuia sp.*), jacarandás (*Jacaranda sp.*), entre otros. (Cabrera, 1976).

La propiedad contó con una actividad forestal selectiva que cesó en la década de 1980 y se encuentra en muy buen estado de conservación.

Metodología

El relevamiento contó con diferentes metodologías para poder abarcar la mayor cantidad de territorio posible. Para esto se combinaron diferentes métodos:

Durante el relevamiento ornitológico utilizamos el método de conteo aleatorio que consiste en recorrer sin paramientos fijos el área de estudio. Se utilizó el camino de acceso a la reserva, una picada que nace en el campamento y va hasta la zona alta y también remontamos algunos cursos de agua presentes que delimitan el área. Se realizaron 10 transectas por cauces de ríos y por senderos dentro de la selva donde se registraron todas las aves que se pudieron identificar. Las transectas se realizaron tanto en horas de la mañana como por la noche para poder detectar aves nocturnas. Se utilizaron reproducciones sonoras en la modalidad “Playback” para la detección de individuos ocultos, ya que estas especies responden a esta metodología.

Para las aves rapaces se realizaron censos desde puntos de observación fijos y duración estándar (Bildstein & Bird 2007). Los relevamientos fueron hechos en horas de la mañana

hasta pasado el mediodía cuando los individuos están más activos y las condiciones de vuelo son óptimas para sus actividades, aumentando así la probabilidad de detección. Los puntos se eligieron estratégicamente con el fin de obtener la mayor probabilidad de observación de los ejemplares, teniendo en cuenta la mejor visibilidad en ambientes forestales y por ser utilizados de manera frecuente por estas especies, aumentando así la posibilidad de detección de individuos.

El trabajo se realizó con binoculares 10x42, cámaras fotográficas y grabadores de sonido. Se utilizó el uso de la modalidad “playback” para la búsqueda de algunas especies, particularmente rapaces nocturnas. Las categorías de amenaza son en base a MAyDS y AA (2017).

La taxonomía utilizada para la confección de la lista está tomada del South American Classification Committee de la American Ornithological Society.

Resultados

Fueron en total 5 días de campo, donde se detectaron 134 especies. La cantidad de especies registradas está relacionada con el tamaño de los remanentes forestales, la diversidad de hábitats y la época del año.

Especies amenazadas:

Encontramos 9 especies dentro de categorías de amenaza nacional (**Tabla 1**).

Tabla 1. Categoría. EC: en peligro crítico, En: en peligro, VU: vulnerable y AM: Amenazada, IC: Insuficientemente conocida.

Nombre Científico	Categoría
<i>Cairina moschata</i>	AM
<i>Penelope bridgesi</i>	VU
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	AM
<i>Vultur gryphus</i>	AM
<i>Strix huhula</i>	AM
<i>Cypseloides rothschildi</i>	IC
<i>Eriocnemis glaucopoides</i>	VU
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	AM
<i>Amazona aestiva</i>	AM

Especies de interés particular:

- Jote cabeza amarilla grande (*Cathartes melambrotus*): Cabe mencionar que durante el relevamiento se registró esta especie lo que es destacable e interesante ya que cuenta con pocos y esporádicos registros en el país y, según MAyDS y AA (2017), sería una especie con “presencia hipotética” en la Argentina.
- Lechuza de las vizcacheras: (*Athene cunicularia*): Es curioso y destacable el hallazgo de un individuo solitario en el cauce del Río Pantanoso. El ejemplar se encontraba en perfecto estado y no parecía tener cavidad donde se refugiara, pero sin embargo, estaba bien asentado en un tramo alto del cauce del río, muy adentro de la selva, situación que destaca ya que esta especie es de ambientes abiertos.
- Bailarín yungueño (*Chiroxiphia boliviana*): Se encontró esta especie con relativa abundancia y es destacable ya que aparentemente se dispersó de la vecina Bolivia en los últimos años y actualmente se encuentra con poblaciones continuas y residentes desde el límite con ese país hasta el PN Calilegua (Ebird 2023).

Bibliografía:

- <https://americanornithology.org/>

-Bildstein KL, Bird DM (2007) Raptor research and management techniques. Hancock House.

-Cabrera AL (1976) Enciclopedia Argentina de agricultura y jardinería: regiones fitogeográficas Argentinas. Acme. Buenos Aires.

-MAyDS y AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina) 2017. Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires, Argentina.

ANEXO 1

Lista de especies de Área Silvestre Protegida “El Pantanoso”:


<u>Nombre científico</u>	<u>Nombre común</u>
<i>Crypturellus tataupa</i>	Tataupá montaraz
<i>Cairina moschata</i>	Pato real
<i>Penelope bridgesi</i>	Pava de monte yungueña
<i>Patagioenas picazuro</i>	Paloma picazuro
<i>Leptotila verreauxi</i>	Yerutí gris
<i>Leptotila megalura</i>	Yerutí yungueña
<i>Zentrygon frenata</i>	Paloma montera grande
<i>Columbina picui</i>	Torcacita picuí
<i>Piaya cayana</i>	Tingazú
<i>Cypseloides rothschildi</i>	Vencejo pardo
<i>Phaethornis pretrei</i>	Ermitaño canela
<i>Colibri serrirostris</i>	Colibrí mediano
<i>Eriocnemis glaucopoides</i>	Picaflor frente azul
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	Picaflor verde
<i>Aramides cajaneus</i>	Chiricote
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	Biguá
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	Hocó oscuro
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Garza bruja
<i>Bubulcus ibis</i>	Garcita bueyera
<i>Ardea cocoi</i>	Garza mora
<i>Ardea alba</i>	Garza blanca
<i>Egretta thula</i>	Garcita blanca
<i>Theristicus caudatus</i>	Bandurria boreal
<i>Sarcoramphus papa</i>	Jote real
<i>Vultur gryphus</i>	Cóndor andino
<i>Coragyps atratus</i>	Jote cabeza negra
<i>Cathartes aura</i>	Jote cabeza colorada
<i>Cathartes burrovianus</i>	Jote cabeza amarilla
<i>Cathartes melambrotus</i>	Jote cabeza amarilla grande
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	Águila viuda
<i>Accipiter striatus</i>	Esparvero estriado
<i>Accipiter bicolor</i>	Esparvero variado
<i>Geranospiza caerulescens</i>	Gavilán patas largas
<i>Buteogallus urubitinga</i>	Águila negra
<i>Rupornis magnirostris</i>	Taguató
<i>Buteo brachyurus</i>	Aguilucho cola corta

<i>Megascops hoyi</i>	Alicucu yungueño
<i>Strix huhula</i>	Lechuza negra
<i>Glaucidium brasilianum</i>	Caburé chico
<i>Athene cunicularia</i>	Laechucita vizcachera
<i>Trogon curucui</i>	Surucuá aurora
<i>Momotus momota</i>	Burgo
<i>Megaceryle torquata</i>	Martín pescador grande
<i>Chloroceryle amazona</i>	Martín pescador mediano
<i>Chloroceryle americana</i>	Martín pescador chico
<i>Ramphastos toco</i>	Tucán toco
<i>Picumnus cirratus</i>	Carpinterito barrado
<i>Dryobates frontalis</i>	Carpintero oliva yungueño
<i>Campephilus leucopogon</i>	Carpintero lomo blanco
<i>Piculus chrysochloros</i>	Carpintero ojo blanco
<i>Colaptes rubiginosus</i>	Carpintero dorado gris
<i>Micrastur ruficollis</i>	Halcón montés chico
<i>Micrastur semitorquatus</i>	Halcón montés grande
<i>Caracara plancus</i>	Carancho
<i>Falco ruficularis</i>	Halcón negro chico
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino
<i>Pionus maximiliani</i>	Loro maitaca
<i>Amazona aestiva</i>	Loro hablador
<i>Pyrrhura molinae</i>	Chiripepé cabeza parda
<i>Primolius auricollis</i>	Maracaná cuello dorado
<i>Batara cinerea</i>	Batará gigante
<i>Taraba major</i>	Chororó
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	Choca corona negruzca
<i>Herpsilochmus atricapillus</i>	Tiluchí plumizo
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Tarefero
<i>Dendrocolaptes picumnus</i>	Trepador colorado
<i>Xiphocolaptes major</i>	Trepador grande
<i>Lepidocolaptes angustirostris</i>	Chincheró chico
<i>Xenops rutilans</i>	Picolezna rojizo
<i>Cinclodes albiventris</i>	Remolinera acanelada
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	Ticotico estriado
<i>Synallaxis scutata</i>	Pijuí canela
<i>Synallaxis frontalis</i>	Pijuí frente gris
<i>Chiroxiphia boliviana</i>	Bailarín yungueño
<i>Pachyramphus viridis</i>	Anambé verdoso
<i>Phylloscartes ventralis</i>	Mosqueta carasucia
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	Mosqueta corona parda

<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	Picochato grande
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	Mosqueta ojo dorado
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	Mosqueta cara canela
<i>Camptostoma obsoletum</i>	Piojito silbón
<i>Elaenia spectabilis</i>	Fiofío grande
<i>Elaenia obscura</i>	Fiofío oscuro
<i>Myiopagis caniceps</i>	Fiofío ceniciento
<i>Suiriri suiriri</i>	Suirirí gris
<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	Mosqueta pico curvo
<i>Phyllomyias sclateri</i>	Mosqueta corona gris
<i>Mecocerculus leucophrys</i>	Piojito gargantilla
<i>Serpophaga nigricans</i>	Piojito gris
<i>Serpophaga subcristata</i>	Piojito tiquitiqui
<i>Serpophaga griseicapilla</i>	Piojito trinador
<i>Pitangus sulphuratus</i>	Benteveo
<i>Casiornis rufus</i>	Burlisto castaño
<i>Knipolegus cabanisi</i>	Viudita plomiza
<i>Knipolegus aterrimus</i>	Viudita trinadora
<i>Myiotheretes striaticollis</i>	Birro grande
<i>Sayornis nigricans</i>	Viudita de río
<i>Contopus fumigatus</i>	Burlisto ceniciento
<i>Contopus cinereus</i>	Burlisto chico
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	Juan chiviro
<i>Cyanocorax chrysops</i>	Urraca criolla
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	Golondrina barranquera
<i>Alopochelidon fucata</i>	Golondrina cabeza rojiza
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	Golondrina ribereña
<i>Troglodytes aedon</i>	Ratona
<i>Turdus rufiventris</i>	Zorzal colorado
<i>Turdus amaurochalinus</i>	Zorzal chalchalero
<i>Turdus nigriceps</i>	Zorzal cabeza negra
<i>Euphonia chlorotica</i>	Tangará garganta negra
<i>Chlorospingus flavopectus</i>	Frutero yungueño
<i>Rhynchospiza dabbenei</i>	Cachilo vallisto
<i>Arremon torquatus</i>	Cerquero vientre blanco
<i>Arremon dorbignii</i>	Cerquero yungueño
<i>Zonotrichia capensis</i>	Chingolo
<i>Psarocolius decumanus</i>	Yapú
<i>Cacicus solitarius</i>	Boyero negro
<i>Cacicus chrysopterus</i>	Boyero ala amarilla
<i>Icterus pyrrhopterus</i>	Boyerito

<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	Arañero cara negra
<i>Setophaga pitiayumi</i>	Pitiayumi
<i>Myiothlypis bivittata</i>	Arañero coronado grande
<i>Myioborus bruniceps</i>	Arañero corona rijoza
<i>Piranga flava</i>	Fueguero
<i>Pheucticus aureoventris</i>	Rey del bosque
<i>Cyanoloxia brissonii</i>	Reinamora
<i>Hemithraupis guira</i>	Sáira dorada
<i>Conirostrum speciosum</i>	Saí celeste
<i>Trichothraupis melanops</i>	Frutero corona amarilla
<i>Saltator coerulescens</i>	Pepitero gris
<i>Thlypopsis sordida</i>	Tangará gris
<i>Microspingus erythrophrys</i>	Monterita ceja rojiza
<i>Pipraeidea melanonota</i>	Saira de antifaz
<i>Thraupis sayaca</i>	Celestino

Anexo Fotos




Burgo (*Momotus momota*)



Chiricote (*Aramides cajanea*)



Hocó oscuro (*Tigrisoma fasciatum*)



Aguilucho cola corta (*Buteo brachyurus*)



Águila viuda (*Spizaetus melanoleucus*)



Piojito gargantilla (*Mecocerculus leucophrys*)



Burlisto copetón (*Contopus fumigatus*)